



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6 **Periodo di Rilevazione: 03/07/2017 - 09/07/2017**

ORGANIZZAZIONE: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

STADIO FENOLOGICO : Indurimento nocciolo


COMPRENSORIO:

P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE

LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO

SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	23,44	3,45	10	=	

CONSIGLI PER LA DIFESA

Sulla base dei risultati dell'attività di campionamento di questa settimana, il grado di infestazione di tignola dell'olivo (*Prays Oleae*) risulta complessivamente sotto la soglia d'intervento con catture di adulti relativamente basse e una percentuale media di infestazione sotto la soglia d'intervento. Pertanto, anche questa settimana non si consiglia alcun intervento, tenendo anche presente che si è nella fase fenologica di inizio indurimento nocciolo, cioè ai limiti per un eventuale trattamento chimico che risulti efficace contro tale parassita.

